Continue

Share — copy and redistribute the material in any medium or format for any purpose, even commercially. Adapt — remix, transform, and build upon the material for any purpose, even commercially. The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms. Attribution — You must give appropriate credit , provide a link to the license, and indicate if changes were made . You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests the licensor endorses you or your use. ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally restrict others from doing anything the license permits. You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or where your use is permitted by an applicable exception or limitation . No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how you use the material. Publicado em 31 de mar. de 2025 Atualizado em 31 de mar. de 2025 A dor de dente é uma das experiências mais incômodas que podemos enfrentar. Não importa a causa, seja uma cárie, infecção nas gengivas ou um dente impactado, essa dor pode ser intensa e persistente. Na busca por alívio rápido e eficaz, muitos de nós já ouvimos falar do medicamento Nimesulida. Neste artigo, vamos explorar tudo sobre a Nimesulida 100mg, como ela funciona para aliviar a dor de dente e o que precisamos saber antes de usá-la.O Que é a Nimesulida?A Nimesulida é um anti-inflamatório não esteroide (AINE) bastante utilizado no Brasil e em outros países. Seu principal objetivo é reduzir a inflamação e aliviar a dor. Muitas pessoas a utilizam para tratar uma variedade de condições, incluindo dores musculares, articulares e, claro, dores de dente.Como Funciona a Nimesulida?Quando ingerimos a Nimesulida, ela atua inibindo a produção de substâncias químicas no corpo chamadas prostaglandinas, que são responsáveis pela sensação de dor e inflamação. Dessa forma, ao bloquear essas substâncias, a Nimesulida ajuda a diminuir tanto a dor quanto a inflamação no local afetado.Usando Nimesulida 100mg Para Alívio da Dor de DenteMuitas pessoas se perguntam: "Como posso usar a Nimesulida para aliviar a dor de dente?" Desde que siga as orientações médicas e as instruções na bula do medicamento, ela pode ser uma excelente opção para o alívio rápido dessa dor incômoda.Dosagem RecomendadaA dosagem padrão para adultos geralmente é de 100mg a cada 12 horas conforme necessário, mas é imprescindível ressaltar que essa dosagem pode variar conforme a orientação do seu médico. Antes de usar, sempre consulte um profissional de saúde para determinar a dosagem adequada para o seu caso específico.Como Tomar Nimesulida?Recomendamos tomar Nimesulida com um copo de água após as refeições, pois isso pode ajudar a minimizar o risco de irritação estomacal. Evitar o consumo do medicamento em jejum é uma boa prática.Efeitos Colaterais da NimesulidaAssim como qualquer medicamento, a Nimesulida pode causar efeitos colaterais. Embora muitos usuários a tolerem bem, é essencial estarmos cientes de possíveis reações adversas que podem ocorrer. Entre os efeitos colaterais mais comuns, podemos mencionar:NáuseasVômitosDor de estômagoDiarreiaTonturasQuando Não Usar a NimesulidaAlguns agrupamentos de pessoas devem evitar a Nimesulida. Pacientes com problemas renais, gastrite, úlceras estomacais ou históricos de reações alérgicas a AINEs devem consultar um médico antes de iniciar o seu uso. Além disso, mulheres grávidas ou lactantes também devem evitar o seu uso sem supervisão médica.Nimesulida versus Outros AnalgésicosNa busca por alívio da dor de dente, muitas pessoas também se deparam com outros analgésicos. Vamos comparar a Nimesulida com algumas opções comuns.ParacetamolO Paracetamol é frequentemente usado para aliviar dores, incluindo dor de dente. Entretanto, ao contrário da Nimesulida, ele não possui propriedades anti-inflamatórias. Portanto, a Nimesulida pode ser mais eficaz em casos onde a inflamação é um fator significativo.IbuprofenoO Ibuprofeno é outro AINE amplamente utilizado. Assim como a Nimesulida, ele oferece alívio da dor e da inflamação. A escolha entre eles pode depender da tolerância individual e da resposta ao medicamento.Dicas Para Aumentar o Alívio da DorEnquanto a Nimesulida pode ser uma solução eficaz para a dor de dente, existem algumas dicas que podem potencializar o alívio da dor:Compressas Frias e QuentesA aplicação de compressas frias ou quentes na área afetada pode proporcionar alívio adicional. Compressas frias ajudam a reduzir o inchaço, enquanto compressas quentes podem relaxar os músculos tensionados.Boa Higiene BucalManter uma boa higiene bucal é fundamental. Escovar os dentes regularmente e usar fio dental ajuda a evitar infecções que podem causar dor de dente.ConclusãoPortanto, a Nimesulida 100mg pode ser uma opção eficaz para quem busca alívio rápido para dor de dente. No entanto, é fundamental que cada um de nós consulte um médico antes de iniciar qualquer tratamento. A dor de dente pode sinalizar problemas mais sérios, e a avaliação profissional é essencial. Com as orientações certas, podemos enfrentar esse desconforto com mais tranquilidade e, quem sabe, um sorriso mais saudável.Perguntas Frequentes (FAQ)1. A Nimesulida pode ser comprada sem receita médica?A Nimesulida geralmente requer uma receita médica, principalmente por causa de seus efeitos colaterais e contraindicações.2. Posso usar Nimesulida com outros medicamentos?É crucial consultar um médico antes de combinar a Nimesulida com outros medicamentos, pois podem ocorrer interações indesejadas.3. Quanto tempo leva para a Nimesulida fazer efeito na dor de dente?Geralmente, a Nimesulida começa a aliviar a dor dentro de 30 minutos a 1 hora após a ingestão.4. O que fazer se a dor persistir mesmo após tomar Nimesulida?Se a dor de dente continuar, procure um dentista ou médico. A dor persistente pode ser um sinal de que há um problema dental que necessita de atenção profissional.ReferênciasInstituto Nacional de Câncer. (2022). Nimed. Disponível em: [INSIRA O LINK AQUI]ANVISA. (2023). Nimesulida – informações sobre o medicamento. Disponível em: [INSIRA O LINK AQUI]Sociedade Brasileira de Dentística. (2023). Manejo da dor em odontologia. Disponível em: [INSIRA O LINK AQUI]Organização Mundial da Saúde. (2022). Diretrizes para a utilização de AINEs. Disponível em: [INSIRA O LINK AQUI]Observação: Este artigo é meramente informativo e não deve substituir a orientação de um profissional de saúde. Quando confrontado com uma dor de dente intensa, recorrer à Nimesulida pode ser uma alternativa viável, contanto que seu uso seja feito de maneira adequada.É crucial aderir estritamente à dosagem prescrita, que normalmente consiste em 100 mg em intervalos de 12 horas. É imperativo, contudo, evitar a utilização prolongada desse medicamento sem a supervisão de um profissional de saúde qualificado, devido aos potenciais riscos associados ao seu uso extensivo.Adicionalmente, é fundamental entender que, embora a Nimesulida possa oferecer alívio temporário para a dor, ela não trata a origem do problema.Portanto, procurar a orientação de um dentista torna-se indispensável para diagnosticar e resolver a causa subjacente da dor de dente.Isso não apenas garante o tratamento adequado da condição dental em questão, mas também previne a ocorrência de complicações futuras, promovendo assim a saúde bucal a longo prazo.Nimesulida para Dor de Dente: 5 AtuaçõesAnti-inflamatórioOs medicamentos anti-inflamatórios desempenham um papel crucial no alívio da dor ao atenuar as inflamações que frequentemente são a raiz do desconforto.Ao interagir com o corpo, esses medicamentos efetivamente diminuem a resposta inflamatória nos tecidos, o que, por sua vez, contribui para a redução significativa da sensação dolorosa.Essa ação não só alivia os sintomas dolorosos, mas também ajuda no combate aos processos inflamatórios que podem estar comprometendo o bem-estar geral do indivíduo.AnalgésicoOs analgésicos são medicamentos projetados especificamente para atuar sobre a dor, proporcionando um alívio direto e eficaz, especialmente em casos de dor de dente.Eles funcionam interagindo com o sistema nervoso para diminuir ou bloquear a percepção de dor, resultando em um conforto imediato para o indivíduo afetado.Ao tomar um analgésico, o paciente pode experimentar uma redução significativa na intensidade da dor de dente, o que facilita a gestão dos sintomas enquanto aguarda tratamento odontológico adequado.AntipiréticoOs medicamentos antipiréticos são essenciais no combate à febre que pode acompanhar infecções dentárias. Eles atuam diretamente sobre o centro regulador da temperatura no cérebro, promovendo a normalização da temperatura corporal.Essa ação não apenas alivia o desconforto causado pela febre, mas também pode ajudar a mitigar outros sintomas associados, melhorando o bem-estar geral do paciente enquanto ele lida com a infecção dental subjacente.Ação RápidaMedicamentos com ação rápida são formulados para oferecer alívio em um curto período de tempo, iniciando seu efeito aproximadamente 30 minutos após a ingestão.Essa característica é particularmente benéfica em situações que exigem uma intervenção imediata, como em casos agudos de dor ou desconforto, proporcionando ao paciente uma sensação de alívio quase imediato e facilitando a gestão dos sintomas de forma mais eficiente enquanto se aguarda um tratamento mais abrangente.Efeito ProlongadoMedicamentos de efeito prolongado são projetados para sustentar o alívio da dor ao longo de um extenso período, chegando a manter sua eficácia por até 12 horas após a administração.Esse tipo de medicamento é ideal para garantir um controle contínuo dos sintomas, permitindo que o paciente mantenha suas atividades diárias com maior conforto e menos interrupções para doses adicionais, contribuindo assim para uma melhor qualidade de vida durante o período de tratamento.Por que a Nimesulida é Proibida em Alguns Países?Certos países proíbem a Nimesulida devido a preocupações com efeitos colaterais significativos, especialmente o risco de complicações hepáticas.Apesar de eficaz contra dores e inflamações, questiona-se a segurança da Nimesulida, exigindo uma reavaliação rigorosa de seu perfil de risco-benefício.Portanto, indivíduos que consideram usar Nimesulida devem buscar orientação e avaliação médica para garantir uma decisão informada e segura sobre seu tratamento.ConclusãoEmbora a Nimesulida possa proporcionar um alívio imediato da dor de dente, é crucial compreender tanto seus efeitos quanto os potenciais riscos envolvidos.Se você enfrenta uma dor de dente constante e debilitante, optar por orientação especializada é, sem dúvida, o caminho mais prudente.Agende uma consulta online na BRdental para uma avaliação detalhada e o tratamento ideal para suas necessidades. Evite que a dor de dente perturbe seu cotidiano; estamos aqui prontos para oferecer a assistência necessária! Route of administration where a substance is taken through the mouth Medical intervention Oral administrationOral administration of a tabletOther namesBy mouth, per os (PO)[edit on Wikidata] A health professional demonstrates how to offer oral medication to a mannequin. Oral administration of a liquid Oral administration is a route of administration whereby a substance is taken through the mouth, swallowed, and then processed via the digestive system. This is a common route of administration for many medications. Oral administration can be easier and less painful than other routes of administration, such as injection. However, the onset of action is relatively low, and the effectiveness is reduced if it is not absorbed properly in the digestive system, or if it is broken down by digestive enzymes before it can reach the bloodstream. Some medications may cause gastrointestinal side effects, such as nausea or vomiting, when taken orally. Oral administration can also only be applied to conscious patients, and patients able to swallow.[1] Per os (/ˌpɜːrˈoʊs/; P.O.) is an adverbial phrase meaning literally from Latin "through the mouth" or "by mouth". The expression is used in medicine to describe a treatment that is taken orally (but not used in the mouth such as, for example, caries prophylaxis).[2] The abbreviation P.O. is often used on medical prescriptions.[citation needed] Enteral administration includes:[citation needed] Buccal, dissolved inside the cheek Sublabial, dissolved under the lip Sublingual administration (SL), dissolved under the tongue, but due to rapid absorption many consider SL a parenteral route Oral (PO), swallowed tablet, capsule or liquid Enteral medications come in various forms, including[3] oral solid dosage (OSD) forms:[4] Tablets to swallow, chew or dissolve in water or under the tongue Capsules and chewable capsules (with a coating that dissolves in the stomach or bowel to release the medication there) Time-release or sustained-release tablets and capsules (which release the medication gradually) Powders or granules and oral liquid dosage forms:[5] Teas Drops Liquid medications or syrups Concomitant ingestion of water facilitates in swallowing tablets and capsules.[6] If the substance has disagreeable taste, addition of a flavor may facilitate ingestion.[6] Substances that are harmful to the teeth are preferably given through a straw.[6] Nothing by mouth List of abbreviations used in medical prescriptions List of Latin phrases Medical prescription Thin-film drug delivery ^ "Oral Administration of Drugs: Advantages and Disadvantages". Retrieved December 8, 2022. ^ Hunnius Pharmazeutisches Wörterbuch (in German) (8th ed.). Berlin: Walter de Gruyter. 1998. p. 1048. ISBN 3-11-015793-4. ^ Institute for Quality and Efficiency in Health Care. "Oral medications". Informed Health Online. Institute for Quality and Efficiency in Health Care. Retrieved 22 June 2013. ^ Jacobs, Terry; Signore, Andrew A. (2016-08-19). Good Design Practices for GMP Pharmaceutical Facilities. CRC Press. ISBN 978-1-4822-5891-2. ^ McCabe-Sellers, Beverly; Frankel, Eric H.; Wolfe, Jonathan J. (2003-04-29). Handbook of Food-Drug Interactions. CRC Press. ISBN 978-0-203-49024-2. ^ a b c TheFreeDictionary > oral administration of medication Citing: Mosby's Medical Dictionary, 8th edition. 2009 Retrieved from " A nimesulida é um anti-inflamatório não esteróide, analgésico e antipirético, que serve para aliviar vários tipos de inflamações, febre ou dores, como dor de garganta, dor de cabeça ou cólicas menstruais. Encontre um Clínico Geral perto de você! Parceria com Buscar Médico Este remédio pode ser comprado em farmácias ou drogarias na forma de comprimidos, cápsula, gotas, granulado, supositório ou pomada, com o nome comercial Nisulid, na forma de genérico (nimesulida) ou com os nomes similares Cimelide, Maxsulid, Nimesilam ou Nortlid, por exemplo. A nimesulida é indicada para adultos ou crianças com mais de 12 anos e deve ser usada com indicação médica. Para que serve A nimesulida pode ser indicada para tratar: Dor de ouvido; Dor de garganta; Dor de dente; Cólica menstrual; Dor após cirurgia dentária; Osteoartrite; Febre; Dor de cabeça; Dor nas articulações. Além disso, na forma de gel ou pomada, a nimesulida pode ainda ser usada para aliviar a dor em tendões, ligamentos, músculos e articulações devido a traumatismos. Como tomar e posologia A forma de usar a nimesulida varia de acordo com a apresentação do remédio. As doses de nimesulida recomendadas pelo médico para adultos ou crianças com mais de 12 anos são: Comprimidos de 100 mg: a dose recomendada é de 50 a 100 mg, ou seja meio a um comprimido por via oral, de 12 em 12 horas; Cápsulas de 200 mg: a dose recomendada é de 1 cápsula por via oral, uma vez ao dia; Comprimidos dispersíveis ou granulado de 100 mg: dissolver 1 comprimido ou o granulado em cerca de 100 mL de água, e tomar por via oral de 12 em 12 horas; Solução em gotas de 50 mg/mL: a dose recomendada é de 1 gota por cada kg de peso corporal, de 12 em 12 horas; Pomada dermatológico: deve ser aplicada uma fina camada sobre a pele na região afetada, 2 vezes ao dia, durante 7 a 15 dias; Supositório de 100 mg: a dose recomendada é de 1 supositório de 100 mg por via retal, a cada 12 horas. No caso do comprimido, cápsula, solução gotas, comprimidos dispersíveis ou granulado, se esquecer de tomar uma dose na hora certa, tomar assim que lembrar mas se estiver perto do horário da próxima dose, deve-se pular a dose esquecida e aguardar o próximo horário de tomar. Em nenhum caso se deve dobrar a dose para compensar a dose esquecida. O tempo de tratamento com a nimesulida deve sempre ser orientado pelo médico. Possíveis efeitos colaterais Os efeitos colaterais mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com nimesulida são diarreia, náuseas ou vômitos. Além disso, embora seja mais raro, pode também ocorrer coceira ou inchaço na pele, suor excessivo, prisão de ventre, aumento dos gases intestinais, gastrite, tonturas, vertigens ou aumento da pressão arterial. Nimesulida dá sono? A nimesulida pode causar sonolência em algumas pessoas, no entanto, este não é um efeito comum do medicamento. Caso se esteja sentindo muita sonolência é importante consultar o médico que receitou o uso de nimesulida. Quem não deve usar A nimesulida não deve ser usada por crianças com menos de 12 anos, mulheres grávidas ou em amamentação, ou por pessoas que tenham úlcera no estômago, hemorragia ou sangramento no trato gastrointestinal, problemas de coagulação sanguínea, insuficiência cardíaca, renal ou hepática grave, ou por pessoas que têm asma, rinite, pólipos nasais ou urticária causados ou exacerbados pelo uso de ácido acetilsalicílico. Além disso, este remédio não deve ser usado por pessoas que tenham alergia à nimesulida ou qualquer outro anti-inflamatório não esteróide como ácido acetilsalicílico, ibuprofeno ou naproxeno, por exemplo. Publicado em: 20 de julho de 2022 Última atualização em: 20 de julho de 2022 Ao entender se Nimesulida serve para dor de dente, é preciso entender também a aplicação correta desse remédio. Caso contrário, podem haver complicações – que são os famosos efeitos colaterais. Afinal, como você sabe, todos os remédios têm efeitos colaterais e por isso é preciso muita atenção! Desta forma, continue lendo este artigo da Agenda Consulta e saiba mais sobre as melhores aplicações do Nimesulida para tratamentos bucais. Sim, serve! O Nimesulida serve para dor de dente em diversas condições diferentes, já que é um remédio ideal para diversos tipos de tratamentos. Ele ajuda a oferecer mais qualidade de vida para pacientes que passaram por algum procedimento, como a própria extração de dentes. Veja como o Nimesulida pode ajudar para o caso de tratamentos dentários: Não sana o problema.Ideal para tratamento de canal.Alivia a dor do siso. Veja também: Bruxismo: causas e principais opções de tratamento. Por mais que o Nimesulida serve para dor de dente, é importante entender que ele não é o mais indicado para tratamentos específicos. Afinal, ele não sana o problema em si. Ele apenas age de maneira que a dor possa ser aliviada. No entanto, a causadora da dor ainda vai continuar por lá e um dentista precisa ser procurado o quanto antes. Para pessoas que fazem tratamento de canal, o Nimesulida pode ser um ótimo parceiro para aliviar a dor. Afinal, a dor do tratamento de canal pode ser um verdadeiro incômodo no dia a dia, já que se trata de um tipo de tratamento bastante invasivo. Portanto, se você fez tratamento de canal, possivelmente o seu dentista vai recomendar o uso de Nimesulida para conter a dor. Se ele não oferecer, peça para ele se, no seu caso, o Nimesulida pode ajudar. A dor do siso pode incomodar muita gente no dia a dia de trabalho. Afinal, ela pode surgir do nada e muitas vezes só vai embora em caso de extração desse dente que nasce “atrasado”. Portanto, se você está com dor do siso, saiba que eventualmente o Nimesulida pode ajudar a aliviar essa dor, já que é um remédio eficiente. No entanto, é fundamental buscar indicação profissional para saber como tomar e quando tomar. O Nimesulida é um medicamento que age diretamente no sistema nervoso central. Ele tem um composto que consegue evitar que o cérebro mande “alertas” para avisar que existe uma dor. Afinal, a dor é também um sinal de alerta de que algo está errado. Ele inibe uma enzima chamada de “ciclooxigenase”. Essa inibição faz com que o corpo não produza substâncias que fazem a dor aparecer. No entanto, isso não significa que o problema foi resolvido. Apenas a dor foi contida. Lembre-se sempre de procurar um dentista especialista e não tome medicamentos sem indicação profissional. Conte com a Agenda Consulta para encontrar um profissional capacitado para, assim, entender os motivos das dores de dente. A Nimesulida 茅 um analg茅sico e anti-inflamat贸rio, muito indicado para aliviar v谩rios tipos de dor, principalmente dores agudas, inflama莽茫o e febre. Mas seri谩 que a nimesulida para dor de dente 茅 eficaz? Primeiro vamos conhecer mais sobre o este rem茅dio e suas propriedades. Ele pode ser encontrado em c谩psulas, gotas, gel, suposit贸rios ou pomada. Pode ser comprado em farm谩cias, em gen茅rico ou com os nomes comerciais Cimelide, Nimesubal, Nisulid, Arflex ou Fasulide, mediante apresenta莽茫o de receita m茅dica. E 茅 importante lembrar que ele n茫o pode ser consumido por menores de 12 anos de idade, e sempre 茅 aconselh谩vel procurar um m茅dico para fazer o uso de medicamentos. A atua莽茫o da Nimesulida para dor de dente 茅 simples, j谩 que seu princ铆pio ativo age diretamente no sistema nervoso central e nas partes do c茅rebro que funcionam como alertas e impedem a fabrica莽茫o de radicais livres. Como tomar nimesulida para dor de dente? Existem recomenda莽玫es espec铆ficas para fazer o uso de nimesulida. E, como todo rem茅dio, 茅 preciso seguir a risca para que o tratamento d谩 certo. Segue recomenda莽玫es: Comprimidos e c谩psulas: 2 vezes/dia (de 12 em 12 horas, ap贸s a refei莽玫es); Gotas: o recomendado 茅 uma gota por cada quilo do peso corporal (2 vezes/dia); Dispers铆veis e granulado: dissolvidos em aproximadamente 10 mL de 谩gua (de 12 em 12 horas, ap贸s a refei莽玫es). As informa莽玫es s茫o obtidas atrav茅s da bula, mas a indica莽茫o de tempo de uso 茅 obtido atrav茅s do m茅dico. No entanto, vamos fazer um apurado t茅cnico de como ela age no organismo. A nimesulida inibe uma enzima chamada 鈥淐icloxigenase鈥, que est谩 relacionada a produ莽茫o de uma subst茫ncia chamada prostaglandina. Essa inibi莽茫o faz com que a dor diminua. O tempo m茅dio estimado para o in铆cio da a莽茫o depois que voc锚 tomar o medicamento 茅 de 15 minutos para al铆vio da dor. E, em casos de febre, a resposta inicial acontece cerca de 1 a 2 horas ap贸s o uso do medicamento e dura aproximadamente 6 horas. Contraindica莽玫es da Nimesulida O uso da nimesulida para dor de dente pode gerar alguns efeitos colaterais. Os mais comuns que podem ocorrer durante o tratamento com nimesulida s茫o diarreia, n谩useas e v么mitos. Pode tamb茅m ocorrer coceira, em caso de alergias, suor excessivo, pris茫o de ventre, aumento dos gases intestinais, gastrite, tonturas, vertigens, hipertens茫o e incha莽o. Por isso 茅 necess谩rio administrar o rem茅dio junto ao m茅dico. Ele est谩 contraindicado para pessoas com alergia a qualquer componente do medicamento, ao 谩cido acetilsalic铆lico ou a outros anti-inflamat贸rios. Tamb茅m n茫o deve ser usado por pessoas com 煤lcera no est么mago, com hemorragia no trato gastrintestinal ou com insufici锚ncia card铆aca, renal ou hep谩tica grave. E n茫o 茅 aconselhado a ingest茫o desse rem茅dio junto ao uso de bebidas alco贸licas. Nimesulida para dor de dente e plano odontol贸gico: qual a rela莽茫o? Primeiro que a dor de dente 茅 o indicativo para problemas que precisam ser detectados por um profissional (no caso dentistas), lembrando que a Nimesulida vai aliviar a dor, mas n茫o vai sanar de vez o poss铆vel problema bucal. Inclusive, o uso da nimesulida para dor de dente 茅 muito indicado por dentistas, seja para ajudar com a dor p贸s tratamento de canal, extra莽茫o de siso ou apenas uma habitual dor de dente. Por茅m, 茅 comum que o problema persista, e assim, 茅 necess谩rio a presen莽a maior do mesmo. Contar com um plano odontol贸gico garante que voc锚 tenha uma presen莽a profissional em seu tratamento e garante que o inc么modo ser谩 resolvido rapidamente, afinal de contas, a dor de dente 茅 um dores piores inc么modos que existem. E o melhor de tudo 茅 que voc锚 garante um tratamento correto, sem suposi莽玫es se ir谩 funcionar ou n茫o, gerando tamb茅m economia ao contar com assist锚ncia di谩ria de profissionais capacitados que ir茫o direto 脿 causa do problema. Bom, esperamos que tenha ficado claro como ministrar este rem茅dio, suas contraindica莽玫es e como evitar que sua dor de dente prolongue-se ou se torne algo maior. Sabemos que sa煤de 茅 coisa s茅ria, o que inclui tamb茅m a sa煤de bucal. Esteja alerta aos sinais que o seu corpo di谩, pois ele sempre te informa quando h谩 algo errado. E, fa莽a o seu papel, esteja em dia com seus exames, fa莽a visitas peri贸dicas ao m茅dico e invista em qualidade de vida. Nimesulida serve para dor de dente? A nimesulida é um dos tipos de anti-inflamatório mais usados e pedidos nas farmácias. Isso se deve a sua amplitude de indicações que envolvem dores agudas e crônicas. Entre essas possíveis indicações está a dor de dente. Saiba mais sobre o uso da nimesulida para dor de dente, conheça suas demais indicações, seus tipos e benefícios. O que é nimesulida? A nimesulida é um tipo de anti-inflamatório não-esteroidal (AINE), sendo a categoria de medicamentos que mais vende em todo o mundo. Além disso, a nimesulida faz parte do 1º degrau da escada de dor da Organização Mundial da Saúde (OMS), sendo uma solução para dores agudas (leves e moderadas) e crônicas geradas por algum processo inflamatório. Sua ação possui propriedades analgésica e antitérmica, podendo não só combater a inflamação, mas também baixar a febre. Sua atuação no organismo, por sua vez, se baseia na inibição da enzima ciclooxigenase e, assim, da cascata do ácido araquidônico, responsável pela síntese de substâncias que estão por trás da inflamação. Por fim, como sendo um anti-inflamatório e analgésico, a nimesulida é frequentemente prescrita pelos dentistas como uma alternativa de alívio à dor de dente, amenizando sua causa, caso ela tenha ligação com algum tipo de inflamação. A nimesulida pode ser encontrada nas farmácias em diferentes formas, seja por solução oral/gotas, comprimidos, cápsulas, gel e supositório. Quando a nimesulida é indicada? A nimesulida, como dito, pode ser indicada para uma variedade de casos. Entre as principais indicações estão: Dor de dente; Dores articulares (tendinite e bursite); Dores em tendões e ligamentos; Desconforto musculares; Desconforto bucal; Inflamação de vias aéreas (sinusite); Dor de garganta; Cólicas. No entanto, vale ressaltar que a nimesulida necessita de uma receita médica para que seja efetuada a compra. Isso, já que se trata de um medicamento tarja vermelha, tendo contraindicações que devem ser levadas em consideração na hora da seleção do medicamento. O seu uso irregular está sob risco de várias reações sérias. Afinal, a nimesulida serve para dor de dente? A nimesulida é um dos mais variados tipos de tratamentos e medicamentos capazes de proporcionar alívio à dor de dente. A dor de dente, por sua vez, pode ser causada por uma série de causas, seja por um trauma causado por algum choque ou queda, pela formação de cárie, por inflamações na polpa do dente, infecções, abscesso dentário e até mesmo pela evolução de doenças da gengiva. A dor de dente é causada pela exposição da dentina, sendo essa a consequência principal dos problemas citados. Dessa forma, o uso da nimesulida é uma das partes do tratamento, que irá variar de acordo com sua causa principal. Nesse sentido, deve-se levar em conta que mesmo em meio a percepção de alívio, nenhuma medida substitui a abordagem feita no consultório odontológico. Contudo, em primeira análise, a dor de dente deve ser tratada ali mesmo na clínica, sendo o uso de fármacos rejeitado antes de o dentista ser consultado. Caso a ingestão do medicamento seja feita de forma incorreta, o estado da infecção do dente pode se agravar ainda mais, isso na ausência de um antibiótico. Considere ainda que quanto mais você demorar a recorrer ao seu dentista, o problema também pode evoluir, intensificando as dores. Além disso, mesmo que a dor se alivie, ainda é necessário que o seu dentista seja consultado para uma avaliação, havendo assim as orientações necessárias quando os bons hábitos na rotina. LEIA TAMBÉM: Nimesulida para que serve: veja a maneira correta de usar e os cuidados Como evitar a dor de dente? Melhor do que tratar a dor de dente, é preveni-la. Tendo em vista que as principais causas da dor de dente são decorrentes do desenvolvimento da placa bacteriana, a ação preventiva aos momentos de desconforto. Dessa forma, é necessário manter a higiene bucal em dia, de forma eficiente e completa. A escovação deve ser feita com uma escova de cerdas macias e um creme dental com flúor, sendo feita em movimentos circulares e de varredura por toda a zona bucal. A escovação deve ser realizada diariamente em meio ao intervalo das refeições. Para o melhor resultado final, a escovação deve ser acompanhada de outros hábitos diários, a passagem de fio dental e o bochecho com o enxaguante bucal, que deve durar ao menos 30 segundos. O mais indicado é que o uso do fio dental e o bochecho com o antisséptico seja feito durante a noite, já que é o período que a salivação diminui. Uma vez que o problema já se faz presente, para evitar um incômodo ainda mais acentuado deve-se evitar alimentos muito quentes ou muito gelados, uma vez que liberam estímulos ainda mais fortes. Bochechos com água morna e a aplicação de uma compressa fria sobre a bochecha do lado em que há a dor também são outra forma de alívio. Qual a vantagem da nimesulida para a dor de dente? A nimesulida tem como principal vantagem a sua ação analgésica e anti-inflamatória, proporcionando o alívio da dor, enquanto atua no controle da inflamação. Um de seus maiores diferenciais quanto aos demais tipos de analgésicos e anti-inflamatórios é a sua potência, que é superior até mesmo que a do ácido acetilsalicílico (AAS). No entanto, não possui uma grande diferença quanto ao diclofenaco e ibuprofeno. Outro ponto positivo é que sua ação contra a febre é tão eficiente quanto a dipirona sódica e o diclofenaco, estando um pouco mais acima do paracetamol. Para um efeito ainda mais rápido, o indicado é que seja ingerida a nimesulida em gotas. O efeito da nimesulida pode ser percebido entre 15 a 2 horas, dependendo do estado do paciente. Pode ser utilizada somente 1 ou 2 vezes ao dia, o que pode fazer do seu esquema posológico um fator positivo. Vale ressaltar aqui a necessidade de prescrição médica do medicamento, estando nas mãos do especialista a escolha do melhor AINE para a recuperação do caso. Quais são os efeitos colaterais da nimesulida? Entre os principais efeitos colaterais do uso irregular da nimesulida está náusea, vômito e diarreia. No entanto, outros sintomas menos comuns também podem ser sentidos, tal como erupção cutânea, coceira, sudorese (suor excessivo), aumento dos gases intestinais, prisão de ventre, gastrite, vertigens, tontura e inchaço. Em casos mais graves, sintomas raros como hemorragia e retenção urinária podem ser percebidos. Diante da superdosagem do remédio o paciente pode identificar complicações como náuseas, vômitos, dores, sonolência, letargia, tontura, aumento da pressão arterial, insuficiência renal, sangramento gastrointestinal, levando até mesmo ao estado de coma. Na presença de qualquer um desses sintomas, a medicação deve ser interrompida e o profissional da saúde consultado. Quais são os cuidados durante o uso? Para o uso adequado da nimesulida, o ideal é considerar alguns cuidados. O ideal é que seu uso seja feito em meio aos intervalos de refeições, sendo engolido por inteiro em meio a algum líquido, no caso do consumo de comprimidos ou cápsulas. A solução oral deve ser aplicada diretamente na boca. Para uma abordagem mais tranquila, o paciente deverá interromper o consumo de álcool durante o período de uso. Além disso, é importante que o médico ou dentista seja avisado a respeito de algum medicamento de uso contínuo para que não haja o risco de ocorrer alguma interação medicamentosa, seja por anticoagulantes, anti-hipertensivos ou por outros anti-inflamatórios. É importante que se tenha em mente que a validade do remédio é de 24 meses, que se encontra ainda mais reduzido durante a abertura. Quanto à manutenção do medicamento, principalmente em casos em que o paciente tenha úlcera ou gastrite, o tempo máximo de uso é de 3 a 7 dias, que pode ser flexibilizado para 15 diante a uma indicação médica. A nimesulida deve ser guardada em um local protegido de luz e umidade, com uma temperatura entre 15°C e 30°C. O local também deve ser em algum ponto alto, evitando o acesso de crianças. Para uma experiência ainda mais tranquila, leia a bula da nimesulida atentamente, siga as orientações de seu especialista e respeite a dosagem diária estabelecida. Visitas regulares ao dentista As visitas regulares ao dentista são essenciais tanto para o tratamento da dor de dente quanto para sua ação preventiva. É pelas idas regulares ao consultório odontológico que você tem acesso ao tratamento adequado e focado na causa da dor de dente, sendo a prescrição de algum fármaco, como a nimesulida, feita somente quando há realmente necessidade. As visitas à clínica devem ter uma periodicidade de 6 em 6 meses, sendo assim possível ser feito os procedimentos regulares, tal como a limpeza profissional (profilaxia). A clínica odontológica OralDents traz um novo conceito em Odontologia. Aliando conforto, tecnologia, técnicas avançadas e equipe qualificada, oferecendo aos clientes excelência em tratamentos odontológicos. O seu sorriso é nossa prioridade! Agende uma avaliação gratuita aqui em uma clínica OralDents mais próxima de você. Você tem alguma pergunta? Deixe sua pergunta abaixo e nós teremos prazer em respondê-las. O Nimesulida é um anti-inflamatório, e como tal possui a função de amenizar os sintomas gerados pela inflamação e tratar sua causa. Sendo assim, o nimesulida é uma das primeiras opção de medicamento para aliviar a dor de dente, principalmente quando ela se deriva de processos inflamatórios. De quanto em quantas horas posso tomar Nimesulida para dor de dente? O intervalo entre as doses da nimesulida é de 12 horas logo você pode tomar 2x ao dia. Sugiro que assim que puder procure um dentista para avaliação presencial. Dor de dente: ibuprofeno e paracetamol são os mais eficazes O ibuprofeno e outros anti-inflamatórios não-esteroides sozinhos ou em combinação com paracetamol são melhores para aliviar a dor de dente, de acordo com uma nova pesquisa realizada pela Faculdade de Odontologia da Universidade Case Western Reserve, nos ... Ao controlar a produção de prostaglandinas, o medicamento proporciona alívio rápido da dor, com efeitos perceptíveis em apenas 15 minutos após a administração. Além disso, também possui ação antipirética, reduzindo a febre em cerca de 1 a 2 horas e mantendo seus efeitos por aproximadamente 6 horas. Os pesquisadores observaram que mais pacientes no grupo que recebeu a nimesulida relataram alívio eficaz da dor: 82% contra 73% entre aqueles que receberam ibuprofeno. Os resultados sugerem que a nimesulida pode ser melhor que o ibuprofeno para combate à dor, mas que ambos têm um alto poder analgésico. Tanto a nimesulida quanto o ibuprofeno são anti-inflamatórios, analgésicos (indicados para dores leves a moderadas) e antitérmicos. Não devem ser usados juntos, devido ao risco de sangramentos e problemas de estômago, fígado ou rins. “Ela é utilizada contra dores articulares, como tendinite e bursite, desconforto muscular e de dente, inflamação de vias aéreas, como sinusite e dor de garganta ou cólicas”, exemplifica a farmacêutica Patrícia Moriel, professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) Como tomar nimesulida em comprimidos? A nimesulida em comprimidos deve ser ingerida uma ou duas vezes por dia, em uma dose de, no máximo, 100 mg, a cada 12 horas. Esta dose excessiva pode aumentar risco de efeitos colaterais (sangramento gastrointestinal, distúrbios na coagulação do sangue, alterações renais, ec). Sugiro consultar seu médico para readequação da medicação e evitar tomar nesta dose e por período superior a 07 dias. Faça bochechos com chá de gengibre e própolis O gengibre tem compostos anti-inflamatórios e analgésicos naturais, que ajudam a reduzir a inflamação ao redor do dente, além de ser antibacteriano. Continue a leitura e confira!Faça bochechos com água e sal. ... Faça bochechos com chá de gengibre com própolis. ... Use o cravo-da-índia. ... Coloque gelo no local. ... Aplique alho no dente dolorido. ... Evite alimentos e bebidas quentes ou frios. ... Evite alimentos açucarados ou ácidos. ... Utilize pastas dentais específicas para dentes sensíveis. Colocar gelo Para ajudar a aliviar a dor mais rápido, pode-se colocar uma bolsa de gelo no rosto, próximo à região dolorida, tendo o cuidado para não queimar a pele. O gelo deve ficar no local durante 15 minutos, e o processo deve ser repetido 3 vezes por dia. O dentista pode prescrever analgésicos para aliviar a dor e antibióticos para combater a infecção. Siga rigorosamente as instruções do profissional de saúde quanto à dosagem e à duração do tratamento. As dores nos dentes pioram a noite por conta da circulação sanguínea na região. Quando você se deita, o fluxo de sangue do corpo é levado para a cabeça. Isso aumenta a pressão na região bucal, levando ao aumento das dores. Para conseguir dormir, tome um analgésico para dor de dente e procure um dentista pela manhã. Assim como outros medicamentos, a nimesulida pode causar alguns efeitos colaterais. Os mais comuns incluem dor de cabeça, tontura, náuseas, vômitos e diarreia. Também pode haver reações alérgicas, como coceira, urticária e inchaço no rosto e na língua. É possível extrair dente inflamado? Sim, é possível realizar a extração de dente inflamado! Entretanto, as condições poderão ser diferentes da extração “normal”. Isso porque quando o dente está inflamado, a anestesia não funciona com eficácia no tecido comprometido, o que